

Legende zu Tabelle II:

Soziologie:

Der Gesellschaftsanschluß der Taxa ist Tabelle III zu entnehmen.

Nomenklatur:

H	HEGI (1906ff.)
L	LINK (1996a)
O	OBERDORFER (1994)
R	ROTHMALER (1990)
T	TIMMERMANN & MÜLLER (1994)
W	WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998)

Häufigkeit der Taxa:

Biotoptypen:

KR KB	Gras- und Krautrain mit Baumreihe
KR KS	Gras- und Krautrain in Sukzession
KR KT	typischer Gras- und Krautrain

Stetigkeiten:

Int.-Sto.	Intensivstandorte beziehungsweise Intensivprobestflächen
abs.	absolute Stetigkeit
%	Stetigkeit in Prozent
x	Taxon vorhanden

Meßtischblattfrequenz (nach ELLENBERG 1991, S. 24 u. 76):

Unsichere Einstufung sind *kursiv* gesetzt.

Kbg. Königsberg

Gefährdung der Taxa:

Änderungstendenz (nach ELLENBERG 1991, S. 25 u. 76):

Unsichere Einstufung sind *kursiv* gesetzt.

Rote Listen (RL):

Es wurden folgende Rote Listen ausgewertet:

Hessen:	Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen Hessens (HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND NATURSCHUTZ 1996)
Deutschland:	Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (<i>Pteridophyta</i> et <i>Spermatophyta</i>) Deutschlands (KORNECK et al. 1996)

Zu den Gefährdungskategorien der Roten Listen Hessens und Deutschlands sowie zur Regionalisierung (reg.) der Roten Liste Hessens siehe Abschn. 4.5.2.

Die auf Grund der Änderungstendenz nach ELLENBERG (1991) und/oder der Zugehörigkeit zu mindestens einer der ausgewerteten Roten Listen als bemerkenswerte Arten (bemA) eingestuften Taxa, sind in Tabelle II **fettgedruckt**.