

Vegetationstabelle XX: Nelkenhafer-Rasen der Mittelstreifen der Wirtschaftswege

Airo-caryophylleae-Festucetum-ovinae Tüxen 1955

49 Ausbildung mit *Scleranthus annuus*, Abbauphase von *Festuca ovina*

Gesellschafts-Nr.			49
Laufende Nr.			165
Feld-Nr.			Sk15
Höhe über NN (m)			325
Exposition			S
Inklination (°)			8
Größe der Aufnahmefläche (m²)			7,2
Bestandeshöhe (cm)			60
Deckung der Krautschicht (%)			82
Deckung der Moosschicht (%)			60
mF (qualitativ)			4,0
mR (qualitativ)			5,0
mN (qualitativ)			3,5
Evenness			0,64
Gesamtartenzahl Krautschicht			34
Anzahl bemerkenswerter Arten			8
<u>Char.</u>			
K	O	V	
V Thero-Airion, O Thero-Airetalia:			
32	A	1	Aira caryophyllea (AC)
32	A	1	Myosotis discolor
D1:			
16	A	1	Scleranthus annuus s. str.
-			Rumex acetosella s. l.
P1:			
-			Festuca ovina agg.
30	B		Agrostis capillaris
38			Hieracium pilosella
30	B		Achillea millefolium
20	A		Poa angustifolia
33	B		Potentilla tabernaemontani
40			Hypericum perforatum
30	B		Lotus corniculatus
33			Pimpinella saxifraga
20	A		Poa compressa
-			Hypochaeris radicata
K Sedo-Scleranthetea:			
32			Cerastium glutinosum
32			Trifolium campestre
32			Veronica arvensis
32	C		Arabidopsis thaliana
32	C	3	Cerastium brachypetalum s. str.
32			Echium vulgare
32			Jasione montana
Begleiter:			
30	B		Bromus hordeaceus
-			Polygonum aviculare agg.
16	A	1	Aphanes arvensis
30			Cerastium holosteoides
30	B		Dactylis glomerata s. str.
38			Luzula campestris
30			Plantago lanceolata
30			Taraxacum sect. Ruderalia
-			Vicia angustifolia
33	B	1	Ranunculus bulbosus
22	A	1	Spergularia rubra
16	A		Viola arvensis