

Vegetationstabelle IV: Cynosurion-Gesellschaften der Gras- und Krautraine

12      **Cynosuro-Lolietum Braun-Blanquet et De Leeuw 1936**, Ausbildung mit *Agrostis capillaris*

**Plantago-major-Trifolium-repens-Gesellschaft**

13      Ausbildung mit *Cichorium intybus*

14      Ausbildung mit *Agrostis stolonifera*

Gesellschafts-Nr.	12	13	14
Laufende Nr.	43	44	45
Feld-Nr.	102/1	KS17	Sb29
Höhe über NN (m)	230	320	240
Exposition	SW	NE	S
Inklination (°)	3	3	2
Größe der Aufnahme­fläche (m²)	12	3,6	3,2
Bestandeshöhe (cm)	80	90	120
Deckung der Krautschicht (%)	85	70	90
Deckung der Moosschicht (%)	< 1	-	< 1
mF (qualitativ)	5,2	5,1	5,3
mR (qualitativ)	5,4	6,5	7,0
mN (qualitativ)	5,5	6,2	6,7
Evenness	0,67	0,79	0,70
Gesamtartenzahl Krautschicht	35	11	16
Anzahl bemerkenswerter Arten	1	-	-

Stet.

		Char.						
K		O	V					
				V Cynosurion:				
30	B	3		<i>Lolium perenne</i> (AC)	2	4	4	2
30	B	3		<i>Leontodon autumnalis</i>	.	1	.	1
				DG <i>Plantago-major-Trifolium-repens-</i> Gesellschaft:				
30				<i>Trifolium repens</i>	+	2b	2b	2
22	A			<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i>	r	2b	2a	2
				D1:				
30	B			<i>Agrostis capillaris</i>	3	.	.	.
40				<i>Hypericum perforatum</i>	1	.	.	.
-				<i>Campanula rotundifolia</i> s. str.	+	.	.	.
-				<i>Stellaria graminea</i>	+	.	.	.
-				<i>Hypochaeris radicata</i>	r	.	.	.
				D2:				
-				<i>Cichorium intybus</i>	.	2a	.	1
				D3:				
30				<i>Agrostis stolonifera</i>	.	.	2b	1
				O Arrhenatheretalia:				
30	B			<i>Dactylis glomerata</i> s. str.	1	1	+	2
30	B			<i>Anthriscus sylvestris</i>	r	.	r	1
30	B			<i>Bromus hordeaceus</i>	2	.	.	.
30	B			<i>Achillea millefolium</i>	1	.	.	.
30	B			<i>Vicia sepium</i>	+	.	.	.
30	B			<i>Heracleum sphondylium</i>	r	.	.	.
				K Molinio-Arrhenatheretea:				
30				<i>Festuca pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	2	1	2a	2
30				<i>Poa pratensis</i> s. str.	+	2b	1	2
30				<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>	+	1	+	2
30				<i>Poa pratensis</i> f. <i>angustifolia</i>	.	.	2a	1
30				<i>Alopecurus pratensis</i>	1	.	.	.
30				<i>Holcus lanatus</i>	1	.	.	.
30				<i>Plantago lanceolata</i>	+	.	.	.
30				<i>Cerastium holosteoides</i>	r	.	.	.
30				<i>Rumex acetosa</i>	r	.	.	.
				Begleiter:				
22	A			<i>Poa annua</i>	1	2a	1	2
-				<i>Poa trivialis</i> s. str.	2	.	2b	1
20	A			<i>Elymus repens</i> s. str.	1	1	.	1
21	A	1		<i>Ranunculus repens</i>	+	.	r	1
20	A			<i>Poa angustifolia</i>	1	.	.	.
22	A	1		<i>Juncus tenuis</i>	+	.	.	.
-				<i>Vicia angustifolia</i>	+	.	.	.
16	A			<i>Vicia hirsuta</i>	+	.	.	.
16	A			<i>Viola arvensis</i>	+	.	.	.
-				<i>Polygonum aviculare</i> agg.	.	.	+	1
17	A			<i>Stellaria media</i> agg.	.	.	+	1
17				<i>Chenopodium album</i>	r	.	.	.
19	B	2		<i>Lapsana communis</i>	r	.	.	.
16	A	1		<b><i>Matricaria recutita</i></b>	r	.	.	.
48				<i>Quercus robur</i> juv.	r	.	.	.
17				<i>Sonchus oleraceus</i>	.	.	r	1