

Vegetationstabelle XIV: Brennessel-Dominanzgesellschaften der Gras- und Krautraine

Urtica-dioica-Dominanzgesellschaft

38 Trennartenlose Ausbildung

38a Trennartenlose Variante

38b Variante von Poa trivialis

Gesellschafts-Nr.

38	
a	b

Laufende Nr.	145	146
Feld-Nr.	114/1	209/1
Höhe über NN (m)	200	240
Exposition	NE	N
Inklination (°)	24	29
Größe der Aufnahmefläche (m²)	4,2	20
Bestandeshöhe (cm)	90	170
Deckung der Krautschicht (%)	100	95
Deckung der Moosschicht (%)	10	95
mF (qualitativ)	5,6	5,9
mR (qualitativ)	6,0	6,3
mN (qualitativ)	7,2	7,3
Evenness	0,34	0,12
Gesamtartenzahl Krautschicht	7	10
Anzahl bemerkenswerter Arten	-	-

Stet.

Char.
K O V

19		DG Urtica-dioica-Dominanzgesellschaft: Urtica dioica	5	5	2
-		D1:			
30		Poa trivialis s. str.	.	+	1
		Alopecurus pratensis	.	r	1
19	B	O Glechometalia:			
		Anthriscus sylvestris	r	+	2
19	B	Heracleum sphondylium	r	r	2
19		K Artemisietea:			
		Galium aparine	2	1	2
20	A	Begleiter:			
		Elymus repens s. str.	1	+	2
21	A	1 Ranunculus repens	r	r	2
48		Poa nemoralis	1	.	1
30	B	Dactylis glomerata s. str. (bez. Begl. K Art)	.	r	1
41	A	3 Rubus idaeus	.	r	1